



**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DÎMBOVIȚA**

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SANATATEA SI BUNASTAREA
ANIMALELOR

Nr. 22703, 07 NOV. 2025

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI DĂRMĂNEȘTI DÂMBOVIȚA		
REGISTRATURA		
Intrare nr. <u>9841</u>		
Anul <u>2025</u>	Luna <u>11</u>	Ziua <u>07</u>

Registr / ogica /

Catre,

Primaria.....

Avand in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

In Romania, la data de 29.10.2025, a fost confirmat un caz de gripa aviara H5N1 la o lebada de vara, in judetul Constanta, ceea ce confirma prezenta virusului in mediul salbatic si necesitatea consolidarii masurilor de preventie.

La nivel european, in ultimele doua saptamani, au fost raportate focare de gripa aviara inalt patogena in 20 tari, afectand 53 exploatatii de pasari domestice si 102 cazuri la pasarile salbatice.

In data de 15 si 17 octombrie 2025, Bulgaria a notificat doua focare de gripa aviara inalt patogena (H5N1) in regiunea Plovdiv, confirmate intr-o ferma de gaine outoare si una cu rate, cu aplicarea masurilor de sacrificare si restrictionare a miscarilor in zonele afectate.

In aceasta perioada are loc migratia de toamna a pasarilor salbatice, palmipelele reprezentand rezervorul natural pentru virusul HPAI, ceea ce implica un risc crescut de raspandire a virusului pe teritoriul Romaniei.

In vederea reducerii riscului contactului intre pasarile domestice si salbatice se impune aplicarea urmatoarelor masuri:

- separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte pasari domestice pentru a limita transmiterea virusului gripei aviare.
- evitarea cresterii pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute in spatii de cazare special amenajate, inchise, iar atunci cand acest lucru nu este posibil, hranirea si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice.
- se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice.
- se va evita intrarea mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana care are grija de animale.

**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DÎMBOVIȚA**

-se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare și alte animale de companie.

-se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea de încălțăminte diferită în spațiul de tinere/creștere a pasărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia încălțămintei.

-prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările salbatice vii, în special cele de apă și păsările salbatice domestice și alte păsări, în special ratele și gastele.

Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor pasărilor domestice și păsări salbatice captivate la luciuri de apă, lacuri, balti, rauri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

În același timp, detectarea timpurie a virusului la păsările salbatice este esențială pentru evitarea contactului cu păsările domestice și pentru a evalua riscul de răspândire în urma descoperirii acestuia la păsările salbatice. **Aceste informații vor fi comunicate proprietarilor de păsări prin intermediul relelelor de socializare, media, etc.**

În atasament va transmitem un pliant de informare ce trebuie afișat în spațiile publice.

Fata de cele relatate va rugăm să dispuneți măsuri în consecință.

De nerespectare rămaneti direct răspunzători.

**Director executiv,
Dr. Tolea Sandu/Marius**

	Nume, Prenume	Funcție	Data	Semnatura
Avizat	Dr. Bucur Marius	Director Executiv Adjunct	07.11.2025	
Avizat	Dr. Cobianu Liviu	Sef SCOSBA	07.11.2025	
Elaborat	Dr. Sillo Razvan	SCOSBA	07.11.2025	



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR



Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.

Factorii care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsări sălbatice și rutele de migrare;

- contactul direct între păsări sau piete;

- contactul cu controlat cu păsări vii;

Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetență, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și barbitelile umflate, de culoare roșu închis;



Protecătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să consulte medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;

- să țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări;

- să limiteze accesul păsărilor domestice la locuri de apă (bălți, lacuri, etc.);

- să consulte și sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitare-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;

- să respecte principiile de biosecuritate;