



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DÎMBOVIȚA

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SANATATEA ȘI BUNĂSTAREA  
ANIMALELOR

Nr. 8329 / 17 APR. 2026

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI  
DĂRMĂNEȘTI DĂMBOVIȚA  
REGISTRATURA  
Intrare nr. 3319  
2026 Luna 04 Ziua 20

*Registrul agricole*

*9*

Catre,

Primaria.....

Va attentionam prin prezenta asupra presiunii virale existente in Romania, generata de evolutia influentei aviare la pasarile salbatice, cu focare declarate in judetele Vaslui, Neamt, Ilfov, Cluj, Bihor si Satu Mare, Precum si la pasari domestice in judetul Tulcea, intr-o exploatare non-profesionala, unde au fost afectate mai multe specii de pasari (galinacee, palmipede si alte specii).

Totodata, va informam cu privire la evolutia influentei aviare inalt patogene la nivel european, in conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2026/526 a Comisiei, care vizeaza focarele din mai multe state membre (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Slovacia, Suedia si Ungaria).

In acest context, va reamintim sa acordati atentie maxima masurilor de prevenire a aparitiei influentei aviare in exploatarile de pasari, astfel:

- separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte pasari domestice pentru a limita transmiterea virusului gripei aviare.
- evitarea cresterii pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute in spatii de cazare special amenajate, inchise, iar atunci cand acest lucru nu este posibil, hranirea si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice.
- se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice.
- se va evita intrarea mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana care are grija de animale.
- se va avea in vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie.
- se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea de incaltaminte diferita in spatiul de tinere/crestere



**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
DÎMBOVIȚA**

a pasarilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia incaltamintei.

-prevenirea oricarui contact direct si indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele de apa si pasarile salbatice domestice si alte pasari, in special ratele si gastele.

Astfel va trebui limitat pe cat posibil accesul tuturor pasarilor domestice si pasari salbatice captive la luciuri de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.

In acelasi timp, detectarea timpurie a virusului la pasarile salbatice este esentiala pentru evitarea contactului cu pasarile domestice si pentru a evalua riscul de raspandire in urma descoperirii acestuia la pasarile salbatice. **Aceste informatii vor fi comunicate proprietarilor de pasari prin intermediul relelelor de socializare, media, etc.**

**In atasament va transmitem un pliant de informare ce trebuie afisat in spatiile publice.**

*Fata de cele relatate va rugam sa dispuneti masuri in consecinta.*

*De nerespectare ramaneti direct raspunzatori.*

**Director executiv  
Dr. Tolea Sandu Marius**



	<b>Nume, Prenume</b>	<b>Funcție</b>	<b>Data</b>	<b>Semnatura</b>
Avizat	Dr. Bucur Marius	Director Executiv Adjunct	17.04.2026	
Avizat	Dr. Cobianu Liviu	Sef SCOSBA	17.04.2026	
Elaborat	Dr. Sillo Razvan	SCOSBA	17.04.2026	



# AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR



## Gripă aviară (Influență aviară)

- boală virală extrem de contagioasă, care afectează în principal păsările, dar poate infecta și specii de mamifere-

**Gripa aviară poate ucide efective întregi de păsări, cauzând pierderi devastatoare.**

### Factori care pot contribui la răspândirea virusului:

- păsările sălbatice și rutele de migrație;
- aglomerări de păsări sau piețele vii;
- comerțul necontrolat cu păsări vii;

### Simptome clinice:

- decubit prelungit, stare letargică;
- inapetență, încetarea ouatului;
- respirație greoaie, tuse, febră;
- aripi zburlite, torticolis, paralizie;
- secreții din cioc și nări;
- creasta și bărbilele umflate, de culoare roșu închis;



### Crescătorii de păsări trebuie să respecte următoarele reguli:

- să anunțe medicul veterinar atunci când apar simptome de îmbolnăvire sau moarte la păsări sau animale;
- să își țină păsările închise în adăposturi pentru a reduce contactul cu alte păsări sălbatice;
- să limiteze accesul păsărilor domestice la luciuri de apă (bălți, lacuri, etc.);
- să acorde tot sprijinul medicilor veterinari și autorităților sanitar-veterinare și să respecte legislația în vigoare privind circulația și transportul păsărilor;
- să respecte normele de biosecuritate;